La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies. Les candidats sont invités à encadrer dans la mesure du possible les résultats de leurs calculs. Ils ne doivent faire usage d'aucun document : l'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.

Exercice 1

Pour tout entier naturel n et tout réel x , on pose :

$$I_n(x) = \int_0^1 (1-t^2)^n \cos(tx) dt.$$

1. Étudier la parité des fonctions I_n .
2. Prouver que les fonctions I_n sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.
3. Démontrer que, pour tout réel x et tout entier naturel n , $I'_n(x) = -\frac{x}{2(n+1)} I_{n+1}(x)$.
4. Prouver par récurrence sur l'entier naturel k , que la fonction I_n est, pour tout entier naturel n , de classe $\mathcal{C}^k$ sur $\mathbb{R}$.

Soit n un entier naturel fixé.

5. **Calcul de $I_n(0)$**
 - (a) Déterminer, pour tout entier naturel p , une relation entre $I_{p+1}(0)$ et $I_p(0)$.
 - (b) En déduire l'expression de $I_n(0)$ à l'aide de factorielles.

6. Calculer la somme :
$$\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k+1)k!(n-k)!}$$

Le résultat sera exprimé à l'aide de factorielles.

7. Donner le développement en série entière au voisinage de 0 et son domaine de validité de la fonction $u \mapsto \cos(u)$.
8. Montrer que la fonction I_n est développable en série entière au voisinage de 0 et déterminer le domaine de validité de ce développement.
Chaque coefficient sera donné sous forme d'une intégrale et on citera avec précision les théorèmes utilisés.
9. Quel résultat démontré antérieurement retrouve-t-on alors pour la fonction I_n ?

Exercice 2

Le but de cet exercice est d'étudier pour un entier n tel que $n \geq 2$ les points critiques de la fonction f définie sur le domaine :

$$\mathcal{D}_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, x_1 < x_2 < \dots < x_n\}$$

par :

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{k=1}^n x_k^2 - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \ln(x_j - x_i)$$

On admettra que $\mathcal{D}_n$ est un ouvert de $\mathbb{R}^n$.

1. Pour tout polynôme P de $\mathbb{R}_n[X]$, on note :

$$\varphi(P) = 4XP'(X) - P''(X).$$

- (a) Montrer que l'application $\varphi : P \mapsto \varphi(P)$ définit un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.
- (b) Écrire la matrice de φ dans la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$.
- (c) Vérifier que le polynôme $3X - 4X^3$ est un vecteur propre de φ pour une valeur propre à préciser.
- (d) Montrer que φ est diagonalisable et préciser la dimension de chacun de ses sous-espaces propres.

2. On s'intéresse dans cette question (et uniquement dans cette question) au cas $n = 2$. On a donc :

$$\mathcal{D}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x < y\}$$

et :

$$f : \begin{pmatrix} \mathcal{D}_2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (x, y) & \longmapsto & x^2 + y^2 - \ln(y - x) \end{pmatrix}$$

- (a) Justifier que f admet des dérivées partielles premières sur $\mathcal{D}_2$ et les calculer. Justifier que f admet des dérivées partielles secondes sur $\mathcal{D}_2$ et les calculer.
- (b) Montrer que f admet un unique point critique : le point de coordonnées $\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$.
- (c) Déterminer les valeurs propres de la matrice $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.
La fonction f admet-elle un extremum local en $\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$?

On revient à présent au cas général avec $n \geq 2$.

3. On note $u = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathcal{D}_n$. On note S le polynôme à coefficients réels défini par :

$$S(X) = \prod_{k=1}^n (X - x_k) \text{ et pour tout } k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \text{ on note : } Q_k(X) = \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n (X - x_i). \text{ On a donc :}$$

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, S(X) = (X - x_k)Q_k(X).$$

- (a) Calculer $\frac{\partial f}{\partial x_k}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$.
- (b) En déduire que :

$$u \text{ est un point critique de } f \iff \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, 2x_k - \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \frac{1}{x_k - x_i} = 0$$

- (c) Montrer que pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a : $S'(x_k) = Q_k(x_k)$ et $S''(x_k) = 2Q'_k(x_k)$.
- (d) Justifier que pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{x_i, 1 \leq i \leq n, i \neq k\}$, on a :

$$Q'_k(x) = Q_k(x) \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \frac{1}{x - x_i}$$

- (e) En déduire que :

$$u \text{ est un point critique de } f \iff \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, S''(x_k) - 4x_k S'(x_k) = 0$$

- (f) Montrer que u est un point critique de f si et seulement si il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que :

$$S'''(X) - 4XS'(X) = \lambda S(X)$$

En observant le terme dominant de S , montrer plus précisément que :

$$u \text{ est un point critique de } f \iff S'''(X) - 4XS'(X) + 4nS(X) = 0$$

4. (a) À l'aide des résultats des questions question 1(d) et 3(f), montrer que la fonction f admet au plus un point critique sur $\mathcal{D}_n$.
- (b) Dans le cas spécifique où $n = 3$, montrer, en utilisant le résultat de la question 1(c), que f admet un unique point critique sur $\mathcal{D}_3$ que l'on déterminera.

Exercice 3

Soit n un entier supérieur ou égal à 2. On désigne par E un espace vectoriel euclidien de dimension n . Le produit scalaire de deux vecteurs x et y de E est noté $\langle x|y \rangle$ et $\|x\|$ représente la norme du vecteur x . Pour tout vecteur u non nul de E , on note φ_u l'application de E dans lui-même définie par :

$$\forall x \in E, \quad \varphi_u(x) = 2 \frac{\langle x|u \rangle}{\langle u|u \rangle} u - x.$$

1. Étude de l'application φ_u

- (a) Montrer que φ_u est un endomorphisme de E .
- (b) En calculant $\varphi_u \circ \varphi_u$, montrer que φ_u est un automorphisme de E et déterminer φ_u^{-1} .
- (c) Soit x appartenant à E , calculer $\langle \varphi_u(x)|\varphi_u(x) \rangle$.
- (d) En déduire que φ_u conserve le produit scalaire, c'est-à-dire que :

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad \langle \varphi_u(x)|\varphi_u(y) \rangle = \langle x|y \rangle.$$

- (e) On note D_u la droite vectorielle de base u et $H_u = D_u^\perp$. Déterminer l'image de D_u par φ_u . En déduire sans calcul que H_u est stable par φ_u .
- (f) Reconnaître alors la nature géométrique de l'endomorphisme φ_u et en donner les éléments caractéristiques.

2. Étude d'un exemple dans le cas $n = 3$

Soit H le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ muni de sa structure euclidienne canonique et constitué des vecteurs $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ tels que $x + y + z = 0$.

- (a) Donner la dimension et une base orthonormale de $H^\perp$.
- (b) Écrire la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ de la projection orthogonale sur $H^\perp$ puis celle de la projection orthogonale sur H .
- (c) Soit v un vecteur unitaire de $H^\perp$. Écrire la matrice de φ_v dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

3. Étude d'une réciproque

Soit ψ un endomorphisme de E tel qu'il existe une droite vectorielle Δ de E vérifiant :

$$\forall x \in \Delta, \quad \psi(x) = x \text{ et } \forall x \in \Delta^\perp, \quad \psi(x) = -x.$$

- (a) Montrer que $\psi \circ \psi = \text{id}_E$ et que ψ conserve le produit scalaire.
- (b) Montrer qu'il existe au moins un vecteur u de E tel que $\psi = \varphi_u$.

Exercice 4

1. Soit n un entier naturel, $n \geq 2$. On pose, lorsque cette intégrale existe,

$$\gamma_n = \int_0^1 \frac{1 - t^{\frac{1}{n}}}{(1 - t)^{1 + \frac{1}{n}}} dt$$

- (a) Soit α un réel strictement positif.
- i. Rappeler un développement limité à l'ordre 2 en 0 de $h \mapsto (1 + h)^\alpha$.

ii. En déduire un équivalent, au voisinage de 1, de $t \mapsto 1 - t^\alpha$.

(b) Soit β un réel. Énoncer une condition nécessaire et suffisante pour que $\int_0^1 \frac{1}{(1-t)^\beta} dt$ converge.

(c) Justifier l'existence de γ_n pour tout $n \geq 2$.

2. On pose pour tout entier naturel m et pour tout réel u : $U_m = \sum_{k=0}^m \frac{u^k}{k!}$. Montrer :

$$\forall p \in \mathbb{N}^*, \forall u \in \mathbb{R}^-, \quad U_{2p-1} \leq e^u \leq U_{2p}$$

3. Démontrer que l'on a, pour tout $t \in]0, 1[$, pour tout $n \geq 2$ et tout $p \geq 1$:

$$1 - \sum_{k=0}^{2p} \frac{1}{k!} \left(\frac{1}{n} \ln(t) \right)^k \leq 1 - \exp \left(\frac{1}{n} \ln(t) \right) \leq 1 - \sum_{k=0}^{2p-1} \frac{1}{k!} \left(\frac{1}{n} \ln(t) \right)^k$$

4. Prouver que, pour tout entier naturel p non nul et tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, l'intégrale $\int_0^1 \frac{\ln^p(t)}{(1-t)^{1+\frac{1}{n}}} dt$ existe.

5. Démontrer que l'on a pour tout $n \geq 2$:

$$\frac{1}{n} \int_0^1 \frac{-\ln(t)}{(1-t)^{1+\frac{1}{n}}} dt - \frac{1}{2n^2} \int_0^1 \frac{\ln^2(t)}{(1-t)^{1+\frac{1}{n}}} dt \leq \gamma_n \leq \frac{1}{n} \int_0^1 \frac{-\ln(t)}{(1-t)^{1+\frac{1}{n}}} dt$$

6. Soit p un entier naturel non nul. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_0^1 \frac{\ln^p(t)}{(1-t)^{1+\frac{1}{n}}} dt \right)$.

Les théorèmes utilisés seront cités avec précision et on s'assurera que leurs hypothèses sont bien vérifiées.

7. Prouver alors que $\lim_{n \rightarrow +\infty} n\gamma_n = \int_0^1 \frac{-\ln(t)}{(1-t)} dt$.

8. Prouver, que pour tout entier naturel p , l'intégrale $\int_0^1 -\ln(t)t^p dt$ existe.

9. Démontrer que l'on a, pour tout entier naturel p , $\int_0^1 -\ln(t)t^p dt = \frac{1}{(p+1)^2}$.

10. Démontrer que $\int_0^1 \frac{-\ln(t)}{1-t} dt = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{1}{(p+1)^2}$.

11. Prouver enfin que : $\gamma_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{\pi^2}{6n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$. On admettra le résultat : $\sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{p^2} = \frac{\pi^2}{6}$.