

Suites de fonctions

(\*\*) **Exercice 1** Étudier la convergence simple et uniforme sur l'intervalle donné de la suite  $(f_n)$  dans les cas suivants.

1.  $f_n : x \mapsto \frac{nx}{1+n^2x^2}$  et  $I = \mathbb{R}$
2.  $f_n : x \mapsto (x + \frac{e^{-x}}{n})^2$  et  $I = \mathbb{R}^+$
3.  $f_n : x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ nx^n \ln(x) & \text{si } x \in ]0, 1] \end{cases}$  et  $I = [0, 1]$
4.  $f_n : x \mapsto e^{-nx} \sin(2nx)$  et  $I = \mathbb{R}^+$  puis  $I = [a, +\infty[$  ( $a > 0$ )
5.  $f_n : x \mapsto \frac{1}{(1+x^2)^n}$  et  $I = \mathbb{R}$  puis  $I = [a, +\infty[$  ( $a > 0$ )

(\*) **Exercice 2** Soit  $f_n : x \mapsto n(\cos x)^n \sin x$  et  $I = \mathbb{R}$ . Étudier la convergence simple sur  $I$ . Comparer

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\pi/2} f_n(t) dt \quad \text{et} \quad \int_0^{\pi/2} \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(t) dt$$

Qu'en déduit-on ?

(\*) **Exercice 3** On considère la suite de fonctions  $u_n : t \mapsto nt(1-t)^n$  sur  $[0, 1]$ .

1. Étudier la convergence simple de cette suite de fonctions. Y a-t-il convergence uniforme sur  $[0, 1]$  ?
2. Soit  $a \in ]0, 1[$ . Justifier que la suite de fonctions  $(u_n)$  converge uniformément sur le segment  $[a, 1]$ . Y a-t-il convergence uniforme sur  $]0, 1[$  ?

(\*) **Exercice 4** Étudier la convergence simple, la convergence uniforme, la convergence sur tout segment de la suite de fonctions  $(u_n)$  donnée par

$$u_n(t) = n \sin(t) e^{-nt} \text{ pour tout } t \in \mathbb{R}^+$$

(\*) **Exercice 5** Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on définit  $f_n(x) = \frac{x^n e^{-x}}{n!}$  pour  $x \in \mathbb{R}^+$ .

1. Montrer que la suite de fonctions  $(f_n)$  converge uniformément sur  $\mathbb{R}^+$  vers une fonction  $f$  à déterminer.
2. Calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(t) dt$  et  $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ .

(\*) **Exercice 6** On pose  $f_n(x) = \frac{\ln(1+nx)}{1+n^2x^2}$  pour  $n \in \mathbb{N}$ .

1. Sur quelle partie  $D$  de  $\mathbb{R}$ , la suite de fonctions  $(f_n)$  converge-t-elle simplement ?
2. Est-ce que  $(f_n)$  converge uniformément sur  $D$  ?

(\*) **Exercice 7**

1. Calculer  $\lim_{x \rightarrow 1^-} \lim_{n \rightarrow +\infty} x^n$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow 1^-} x^n$ .

2. Calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 n^2 t e^{-nt} dt$  et  $\int_0^1 \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 t e^{-nt} dt$ .

---

(\*) **Exercice 8** Soit  $(f_n)$  une suite de fonctions bornées, avec  $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . On suppose que la suite  $(f_n)$  converge uniformément vers  $f$ . Montrer que  $f$  est bornée. Montrer que le résultat ne persiste pas si on suppose uniquement la convergence simple.

---

(\*) **Exercice 9** Soit  $(f_n)$  une suite de fonctions décroissantes définies sur  $[0, 1]$ , telle que  $(f_n)$  converge simplement vers la fonction nulle. Montrer que la convergence est en fait uniforme.

---

(\*) **Exercice 10** Soient  $(f_n)$  et  $(g_n)$  deux suites de fonctions définies sur un même intervalle  $I$  et à valeurs dans  $\mathbb{R}$ . On suppose que  $(f_n)$  et  $(g_n)$  convergent uniformément sur  $I$  vers respectivement  $f$  et  $g$ . On suppose de plus que  $f$  et  $g$  sont bornées. Démontrer que la suite de fonctions  $(f_n g_n)$  converge uniformément vers  $fg$ .

---

(\*\*\*) **Exercice 11** Démontrer que la limite uniforme d'une suite de fonctions uniformément continues définies sur un intervalle  $I$  de  $\mathbb{R}$  est elle-même une fonction uniformément continue.

---

(\*\*\*\*) **Exercice 12** Soit  $f$  la fonction définie de l'intervalle  $I = [0, 1]$  dans lui-même par la relation  $f(x) = 2x(1 - x)$ , et  $f_n$  la fonction itérée d'ordre  $n$  de  $f$  :

$$f^n = \underbrace{f \circ f \circ \cdots \circ f}_{n \text{ facteurs}}$$

1. Étudier la convergence simple de la suite de fonctions  $(f_n)$  sur  $[0, 1]$ .
  2. Montrer qu'il y a convergence uniforme sur tout segment de la forme  $[a, \frac{1}{2}]$  où  $a \in ]0, \frac{1}{2}[$ . Sans nouveau calcul, expliquer pourquoi il y a convergence uniforme sur tout segment de la forme  $[a, b]$  avec  $0 < a < b < 1$ .
- 

### Séries de fonctions

(\*) **Exercice 13** Étudier la convergence simple puis la convergence uniforme, de la série  $\sum u_n$  de fonctions définies sur  $\mathbb{R}$  par  $u_n(t) = \frac{\sin(nt)}{n^2 + 1}$ .

---

(\*) **Exercice 14** Étudier la convergence simple puis la convergence uniforme, de la série  $\sum u_n$  de fonctions définies sur  $\mathbb{R}^+$  par  $u_n(t) = \frac{(-1)^n}{n + t}$ .

---

(\*\*) **Exercice 15** Soit  $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-x\sqrt{n}}$ .

1. Donner le domaine de définition de  $S$ .
  2. Étudier ses variations et donner la limite de  $S$  en  $+\infty$ .
  3. Étudier la continuité de  $S$  sur son intervalle de définition.
  4. Donner un équivalent simple de  $S$  en  $0^+$  (on utilisera une comparaison série-intégrale).
- 

(\*) **Exercice 16** Calculer  $\int_0^1 \sum_{n=2}^{+\infty} \left( \frac{1}{n-x} - \frac{1}{n+x} \right) dx$ .

---

(\*\*) **Exercice 17** Pour  $x \geq 0$ , on pose  $u_n(x) = \frac{x}{n^2 + x^2}$ .

1. Montrer que la série  $\sum_{n \geq 1} u_n$  converge simplement sur  $\mathbb{R}^+$ .
  2. Montrer que la série  $\sum_{n \geq 1} u_n$  converge uniformément sur tout intervalle  $[0, A]$  avec  $A > 0$ .
  3. Vérifier que, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{n}{n^2 + k^2} \geq \frac{1}{5}$ . En déduire que la série  $\sum u_n$  ne converge pas uniformément sur  $\mathbb{R}^+$ .
- 

(\*\*) **Exercice 18** Soit  $f_n(x) = nx^2 e^{-x\sqrt{n}}$  pour  $x \in \mathbb{R}_+$  et  $n \in \mathbb{N}$ .

1. Étudier la convergence simple, la convergence normale et la convergence uniforme de la série  $\sum f_n$  sur  $\mathbb{R}^+$ .
  2. Mêmes questions sur  $[a, +\infty[$  avec  $a > 0$ .
- 

(\*\*\*) **Exercice 19** Pour  $\alpha$  réel et  $n \in \mathbb{N}^*$ , on considère les fonctions  $u_n$  définies sur  $[0, 1]$  par :

$$u_n(x) = n^\alpha x^n (1-x)$$

1. Pour quels réels  $\alpha$  la **suite**  $(u_n)$  converge-t-elle uniformément sur  $[0, 1]$  ?
  2. Pour quels réels  $\alpha$  la **série**  $\sum u_n$  converge-t-elle uniformément sur  $[0, 1]$  ?
- 

(\*\*) **Exercice 20** Pour  $x \in [0, +\infty[$ , on pose  $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \ln(1 + \frac{x}{n})$ .

1. Montrer que la fonction  $S$  est bien définie sur  $[0, +\infty[$  et de classe  $\mathcal{C}^1$ .
  2. Étudier ses variations.
- 

(\*\*) **Exercice 21** Pour  $n \in \mathbb{N}$  et  $x \in \mathbb{R}_+$ , on pose  $u_n(x) = \arctan(n+x) - \arctan(n)$ .

1. À l'aide, par exemple, de l'inégalité des accroissements finis, montrer que la série  $\sum u_n$  converge simplement sur  $\mathbb{R}_+$ .  
On pose  $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x)$ .
  2. Montrer que  $S$  est continue sur  $\mathbb{R}_+$ .
  3. (\*\*) Déterminer la limite de  $S$  en  $+\infty$ . On montrera que pour tout réel  $x > 0$ ,  
 $\arctan(x) + \arctan(\frac{1}{x}) = \frac{\pi}{2}$ .
  4. La série de fonctions  $\sum u_n$  converge-t-elle uniformément sur les intervalles  $[A, +\infty[$  avec  $A > 0$  ?
- 

(\*\*) **Exercice 22** On donne  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ . Pour  $t$  réel et  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $u_n(t) = \frac{\arctan(nt)}{n^2}$ .

1. Montrer que la série de fonctions  $\sum u_n$  converge simplement sur  $\mathbb{R}$ . On note  $S$  la fonction somme.
2. Montrer que  $S$  est continue sur  $\mathbb{R}$ , croissante, et préciser sa parité.
3. Déterminer la limite de  $S$  en  $+\infty$ .
4. (\*\*) Soit  $N \in \mathbb{N}^*$ . Montrer qu'il existe  $t_N > 0$  tel que pour tout  $t \in ]-t_N, t_N[\setminus\{0\}$ ,

$$\sum_{n=1}^N \frac{u_n(t)}{t} \geq \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n}$$

5. En déduire que la courbe représentative de  $S$  admet une tangente verticale au point d'abscisse 0.
  6. Tracer la courbe représentative de  $S$ .
- 

(\*\*) **Exercice 23**  $I = ]-1, +\infty[$  et  $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+x} \right)$ .

- Montrer que  $S$  est définie et continue sur  $I$ . Étudier sa monotonie.
  - Calculer  $S(x+1) - S(x)$ . En déduire un équivalent de  $S(x)$  quand  $x$  tend vers  $-1$  par valeurs supérieures.
  - Établir que pour tout  $p \in \mathbb{N}^*$ ,  $S(p) = \sum_{k=1}^p \frac{1}{k}$ . En déduire un équivalent de  $S(x)$  en  $+\infty$ .
- 

(\*\*) **Exercice 24** Pour  $x \geq 0$ , on pose  $f_n(x) = \frac{(-1)^n e^{-nx}}{n+1}$ .

- Montrer que la série de fonctions  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge simplement sur  $\mathbb{R}^+$ . On note  $S$  sa somme.
  - La série de fonctions considérée converge-t-elle normalement ? uniformément sur  $\mathbb{R}^+$  ?
  - Résoudre :  $y' - y = -\frac{e^x}{e^x + 1}$  sur  $]0, \infty[$ .
  - Montrer que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} S(x) = 1$ . En déduire l'expression de  $S$  à l'aide de fonctions usuelles.
- 

(\*\*\*) **Exercice 25** Soit  $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{nx^{2n-1}}{1-x^{2n}}$ .

- Déterminer le domaine de définition  $D$  de  $S$ .
  - Montrer que  $S$  est de classe  $C^1$  sur  $D$  et étudier ses variations.
  - Étudier les limites de  $S$  aux bornes de  $D$ .
- 

(\*) **Exercice 26** Soit  $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+x}$ .

- Montrer que  $S$  est définie et de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}_+^*$ . Montrer que pour tout  $x > 0$ ,  $S'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n+x)^2}$ .
  - À l'aide du critère spécial des séries alternées, trouver la monotonie de  $S$ .
  - Montrer que pour  $x > 0$ ,  $S(x+1) + S(x) = \frac{1}{x}$ . En déduire un équivalent de  $S(x)$  en 0.
- 

(#) **Exercice 27** On pose  $D(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x}$ .

- Montrer que la fonction  $D$  est définie et de classe  $C^1$  sur  $]0, +\infty[$ .
- Vérifier que pour  $x > 0$ ,

$$D(x) = \sum_{p=1}^{+\infty} \left( \frac{1}{(2p-1)^x} - \frac{1}{(2p)^x} \right)$$

À l'aide d'une comparaison série-intégrale, déterminer alors la limite de  $D(x)$  quand  $x$  tend vers 0 par valeurs supérieures.

---

### Approximation polynomiale

(\*\*) **Exercice 28** Approximation polynomiale de la racine carrée.

On considère la suite  $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de polynômes définie par  $P_0 = 0$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $P_{n+1} = P_n + \frac{1}{2}(X - P_n^2)$ .

- Montrer que la suite  $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est bien polynomiale et préciser le degré de  $P_n$ .
- Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , tout  $x \geq 0$ ,

$$P_{n+1}(x) - \sqrt{x} = (P_n(x) - \sqrt{x}) \left( 1 - \frac{1}{2}(P_n(x) + \sqrt{x}) \right)$$

- Montrer que pour tous  $n \in \mathbb{N}$  et  $x \in [0, 1]$ ,  $0 \leq P_n(x) \leq P_{n+1}(x) \leq \sqrt{x}$ .

4. En déduire que la suite  $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge simplement sur  $[0, 1]$ , en croissant, vers une fonction  $f$  à préciser.
5. Montrer que pour tout  $x \in [0, 1]$  et tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$0 \leq \sqrt{x} - P_n(x) \leq \sqrt{x} \left(1 - \frac{\sqrt{x}}{2}\right)^n$$

6. Prouver alors que la convergence de  $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$  vers  $f$  est uniforme.
- 

(\*) **Exercice 29** Sur  $\mathbb{R}[X]$ , on définit les deux normes  $N_1$  et  $N_2$  par

$$N_1(P) = \sup_{t \in [-2, -1]} |P(t)| \text{ et } N_2(P) = \sup_{t \in [1, 2]} |P(t)|$$

On note  $f$  la fonction définie sur l'intervalle  $[-2, 2]$  ainsi :  
pour tout  $x \in [-2, -1]$ ,  $f(x) = x^2$ , pour tout  $x \in [-1, 1]$ ,  $f(x) = 1$  et pour tout  $x \in [1, 2]$ ,  $f(x) = x^3$ .

1. Représenter graphiquement la fonction  $f$  et justifier l'existence d'une suite de fonctions polynômes  $(P_n)$  qui converge uniformément vers la fonction  $f$  sur  $[-2, 2]$ .
  2. Démontrer que cette suite de polynômes  $(P_n)$  converge dans  $\mathbb{R}[X]$  muni de la norme  $N_1$  vers  $X^2$  et étudier sa convergence dans  $\mathbb{R}[X]$  muni de la norme  $N_2$ .
- 

(\*\*\*) **Exercice 30** Soient  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$  une fonction continue et, pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , le polynôme  $B_n$  défini par :

$$\forall x \in [0, 1], \quad B_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) x^k (1-x)^{n-k}$$

1. Calculer  $B_n$  pour  $f : x \mapsto 1$ ,  $f : x \mapsto x$ , et  $f : x \mapsto x^2$ .
2. Déduire des calculs précédents que pour tous  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $x \in [0, 1]$ ,

$$\sum_{k=0}^n (k-nx)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = nx(1-x) \leq \frac{n}{4}$$

3. Soit  $\varepsilon > 0$ .
    - (a) Justifier l'existence d'un réel  $\alpha > 0$  tel que pour tout  $(x, y) \in [0, 1]^2$  vérifiant  $|x - y| \leq \alpha$ ,  $|f(x) - f(y)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ .
    - (b) En déduire que pour tous  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $x \in [0, 1]$ ,  $|B_n(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\|f\|_\infty}{2n\alpha^2}$ .
    - (c) Prouver alors que la suite de polynômes  $(B_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  converge uniformément vers  $f$  sur le segment  $[0, 1]$ .
- 

Banque épreuve orale CCINP

Analyse : 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 48, 53.

---